

# Dosing for Infants and Children From Your Healthcare Professional

If possible, use weight to dose; otherwise, use age.

# Dosificación para Bebés y Niños Recomendada por su Médico

De ser posible, use el peso para determinar la dosis; de lo contrario, use la edad.

## Infants' MOTRIN® Concentrated Drops



**Active Ingredient:**  
Ibuprofen 50 mg (NSAID)\*  
(in each 1.25 mL)

**Dose:** Every 6-8 hours as needed.  
DO NOT GIVE MORE THAN 4  
DOSES IN 24 HOURS.

**Ingrediente activo:**  
Ibuprofeno 50 mg (AINE)\*  
(por cada 1.25 ml)

**Dosis:** Cada 6 a 8 horas, según  
sea necesario. NO EXCEDA  
MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.

Use product only as directed.



mL = milliliter

Use únicamente según  
las indicaciones.

ml = mililitro

\*Nonsteroidal anti-inflammatory drug

\*Antiinflamatorios no esteroideos

WEIGHT (PESO)	—	12-17 lbs	18-23 lbs
AGE (EDAD)	<6 months/meses	6-11 months/meses	12-23 months/meses
DOSE (DOSIS)	—	1.25 mL 	1.875 mL 

## Children's MOTRIN® Oral Suspension



**Active Ingredient:**  
Ibuprofen 100 mg (NSAID)\*  
(in each 5 mL)

**Dose:** Every 6-8 hours as needed.  
DO NOT GIVE MORE THAN 4  
DOSES IN 24 HOURS.

**Ingrediente activo:**  
Ibuprofeno 100 mg (AINE)\*  
(por cada 5 ml)

**Dosis:** Cada 6 a 8 horas, según  
sea necesario. NO EXCEDA MÁS  
DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.

Use product only as directed.






mL = milliliter

Use únicamente según las  
indicaciones.

ml = mililitro

\*Nonsteroidal anti-inflammatory drug

\*Antiinflamatorios no esteroideos

WEIGHT (PESO)	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE (EDAD)	2-3 years/años	4-5 years/años	6-8 years/años	9-10 years/años	11 years/años
DOSE (DOSIS)	5 mL 	7.5 mL 	10 mL 	12.5 mL 	15 mL 

### IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

Today's Date: \_\_\_\_\_

This dosing recommendation from your doctor will expire in 14 DAYS.

- Read and follow the label on all MOTRIN® products.
- Repeat dose every 6-8 hours as needed.
- Do NOT give more than 4 doses in 24 hours.
- Use only the dosing device (syringe or dosing cup) that came with the product.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO DEL PRODUCTO

Fecha de hoy: \_\_\_\_\_

Esta dosis recomendada por su médico expirará en 14 DÍAS.

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta en todos los productos MOTRIN®.
- Repita la dosis cada 6-8 horas según sea necesario.
- NO exceda más de 4 dosis en 24 horas.
- Use únicamente el dosificador (jeringa o medidor) que viene con el producto.